

Приложение 1

Субъектам фармацевтического рынка
Медицинским организациям

Уважаемые коллеги!

Филиал ООО «Джонсон & Джонсон» в Республике Казахстан выражает Вам свое почтение и настоящим письмом информирует вас об утверждении Приказом Председателя РГУ «Комитет медицинского и фармацевтического контроля» Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года № 048902 обновленной инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата «Дакоген® лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг №1». Изменения внесены в раздел «Специальные предупреждения» инструкции по медицинскому применению (в таблице 1 представлена детальная информация, изменения выделены жирным шрифтом).

Таблица №1

Предыдущая версия инструкции	Утвержденная 24.02.2022 г. версия инструкции
<p>Специальные предупреждения</p> <p><i>Во время беременности и лактации</i></p> <ul style="list-style-type: none">При беременности или кормлении грудью, предположении о наличии беременности или планировании беременности, проконсультируйтесь с лечащим врачом до начала применения данного лекарственного препарата.Не следует применять препарат Дакоген® при беременности, так как это может причинить вред ребенку. Незамедлительно сообщите лечащему врачу при наступлении беременности на фоне лечения препаратом Дакоген®.Не осуществляйте грудное вскармливание на фоне лечения препаратом Дакоген®, так как нет данных о том, передается ли данный лекарственный препарат с материнским молоком.	<p>Специальные предупреждения</p> <p><i>Во время беременности и лактации</i></p> <ul style="list-style-type: none">При беременности или кормлении грудью, предположении о наличии беременности или планировании беременности, проконсультируйтесь с лечащим врачом до начала применения данного лекарственного препарата.Не следует применять препарат Дакоген® при беременности, так как это может причинить вред ребенку. При наличии детородной способности, лечащий врач попросит провести тест на беременность перед началом лечения препаратом Дакоген®. Незамедлительно сообщите лечащему врачу при наступлении беременности на фоне лечения препаратом Дакоген®.Не осуществляйте грудное вскармливание на фоне лечения препаратом Дакоген®, так как нет данных о том, передается ли данный лекарственный препарат с материнским молоком.
<p>Контрацепция у мужчин и женщин</p> <ul style="list-style-type: none">Мужчинам не рекомендуется зачатие ребенка на фоне лечения препаратом Дакоген®.Мужчинам следует использовать эффективные средства контрацепции во время лечения препаратом Дакоген® и в течение 3 месяцев после окончания лечения.При принятии решения о консервации спермы, проконсультируйтесь с лечащим	<p>Контрацепция у мужчин и женщин</p> <ul style="list-style-type: none">Мужчинам не рекомендуется зачатие ребенка на фоне лечения препаратом Дакоген®.Мужчинам следует использовать эффективные средства контрацепции во время лечения препаратом Дакоген® и в течение 3 месяцев после окончания лечения.При принятии решения о консервации спермы, проконсультируйтесь с лечащим

<p>врачом до начала лечения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Женщины должны использовать эффективные средства контрацепции во время лечения. Безопасный период для зачатия ребенка после окончания лечения препаратом Дакоген® неизвестен. <p>При принятии решения о криоконсервации яйцеклеток, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом до начала лечения препаратом Дакоген®.</p>	<p>врачом до начала лечения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Женщины, обладающие детородной способностью, должны использовать эффективные средства контрацепции во время лечения и в течение 6 месяцев после завершения лечения. <p>При принятии решения о криоконсервации яйцеклеток, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом до начала лечения препаратом Дакоген®.</p>
--	--

Утвержденная инструкция размещена в государственном реестре лекарственных средств по адресу: http://register.ndda.kz/category/search_prep (№ РК-ЛС-5№020784)

С уважением,

Руководитель Филиала
ООО «Джонсон & Джонсон» в РК



Назарбаев А.А.